

PLÁN PREVENCE VZNIKU DEKUBITŮ

Jméno pacienta:	Rok narození:
-----------------	---------------

Rozšířená stupnice rizika dekubitů dle Nortonové:

- měření rizika vzniku proved' při příjmu pacienta
- přehodnocení opakuj vždy 1 x týdně
- měření proved' vždy při změně stavu
- nebezpečí dekubitů vzniká při 25 bodech a méně
- 14 bodů a méně – okamžitá preventivní opatření

Datum	Schopnost spolupráce	Věk	Stav pokožky	Každé další onemocnění	Fyzický stav	Stav vědomí	Aktivita	Pohyblivost	Inkontinence	bodování	součet
	úplná	< 10	normální	žádné	dobrý	bdělý	chodí	úplná	není	4	
	částečně omezená	< 30	alergie	dm, febrilie, anemie	zhoršený	apatický	chodí s doprovodem	částečně omezená	občas	3	
	velmi omezená	<60	vlhká	trombóza, obezita	špatný	zmatený	sedačka	velmi omezená	převážně moč	2	
	žádná	> 60	suchá	karcinom	velmi špatný	bezvědomí	leží	žádná	moč + stolice	1	

Zkratky: Z – záda, LB – levý bok, PB - pravý bok, B – břicho, AP – antidekubitní pomůcky,
HP – hygienické pomůcky, IP – inkontinentní pomůcky

Poznámka:

[illegible]