D E Z I N F E K Č N Í Ř Á D

Nemocnice Havlíčkův Brod

Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod

DEZINFEKČNÍ ŘÁD PŘI ZVÝŠENÝCH HYGIENICKO - EPIDEMIOLOGICKÝCH REŽIMECH
MRSA, CLOSTRIDIA, ROTAVIRY, NOROVIRY, TBC, MULTIREZISTENTNÍ BAKTERIÁLNÍ KMENY atd.

	oblast použití	přípravek	účinná látka	koncentrace	expozice	účinnost	způsob aplikace
RUCE	HYGIENICKÉ MYTÍ	PROSAVON Scrub	chlorhexidin,KAS,biquanid	3ml	1 min	A + MRSA	Navlhčit ruce, nanést mýdlo, 30 s umývat, opláchnout tekoucí vodou, utřít do jednorázového ručníku.
	HYGIENICKÁ DEZINFEKCE	PROMANUM Pure	A + MRSA	3 ml	30 s	ABTM MRSA	3 ml dezinfekčního prostředku nanést na suché ruce, 30 s vtírat stanoveným postupem do zaschnutí.
	CHIRURGICKÁ DEZINFEKCE	PROMANUM Pure	alkohol	2 x 5 ml	3 min	ABMT MRSA	10 ml dezinfekčního prostředku vtírat 3-5 min do pokožky rukou a předloktí do úplného zaschnutí. Ruce se neotírají.
	DEZINFEKCE RUKOU PŘI VÝSKYTU CLOSTRIDIÍ	1. krok PROSAVON Scrub	mycí emulze	3ml	1 min	A + MRSA	POZOR !!! Ruce nejdříve důkladně umýt 1 min s vodou a mýdlem, poté dokonale osušit jednorázovým ručníkem. Na závěr provést hygienickou dezinfekci rukou. BRAUNOL - první volba při pozitivní kultivaci clostridium perfringens.
		2. krok PROMANUM Pure	A + MRSA	2 x 5 ml	1 min	ABMT MRSA	
		2. krok BRAUNOL	vodný roztok PVP jodu	2 x 5 ml	1 min	ABCMTV MRSA	
	OŠETŘENÍ RUKOU	TRIXO TRIXO lind	kosmetická emulze	Vtírat do pokožky dle potřeby a vždy na závěr pracovní směny			
	UDRŽOVAT VLHKÉ RUCE OD TEKUTÉHO ALKOHOLOVÉHO DEZINFEKČNÍHO PŘÍPRAVKU PO CELOU DOBU EXPOZICE !!!!						
POKOŽKA	DEZINFEKCE POKOŽKY A OPERAČNÍHO POLE	SOFTASEPT N	etanol, propanol	konc.	vpich - 15 s	ABMTV MRSA	Pokožku důkladně smočit, nechat zaschnout. Dodržovat expozici dle dezinfikované oblasti. Na operační pole používat barevný dezinfekční roztok.
		SEPTODERM	alkohol	konc.	vpich - 15 s	ABMTV MRSA	
		BRAUNODERM	alkohol , PVP jód	konc.	do zaschnutí	ABTMV MRSA	
	DEKOLONIZACE pacienta při výskytu MRSA	PRONTODERM roztok	polyhexanid , betain	konc.	dekolonizace celého těla a osobních předmětů		
		PRONTODERM koncentrát		1 : 4	smíchat 1 díl koncentrátu : 4 dílem pitné vody 42°C		
		PRONTODERM gel light		konc.	dutina nosní		
		PRONTODERM gel strong		konc.	samodekolonizace mobilních pacientů a personálu		
		PRONTODERM pěna		konc.	200 ml lahev s mechanickým napěňovačem		
		PRONTORAL		konc.	výplach dutiny ústní a nosohltanu		
		STELLISEPT med gloves		konc.	mycí žínka, dekolonizace celého těla, není nutno oplachovat		
	NA SLIZNICE A RÁNY	BRAUNOL	vodný roztok PVP jodu	konc.	1 min	ABCMTV MRSA	Sliznici důkladně smočit a nechat zaschnout. Případné ředění dle indikace a příbalové informace
		ActiMaris - sensitive, forte, gel	singletový kyslík, mořská sůl,	konc.	30 min	ABVC MRSA	Aplikovat na kůži nebo na sliznici, doporučení viz. Příbalové informace
NÁSTROJE	DEKONTAMINACE NÁSTROJŮ A POMŮCEK Z PRYŽE, PLASTŮ, SKLA	SEKUSEPT Aktiv	peroxouhličitan sodný	2%	15 min	ABCTMV MRSA	Ponořit do pracovního roztoku po stanovenou dobu expozice.
		PROCURA Endo star	KAS, biquanid, amin	3%	15 min	ABCTMV MRSA	
	DEZINFEKCE VŠECH POVRCHŮ, PLOCH A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 3 X DENNĚ						
MALÉ PLOCHY	DEZINFEKCE MALÝCH PLOCH A ZP	PROCURA PE	peroxosloučenina	0,3%	30 min	ABCTMV MRSA	Vytřít či omýt pracovním roztokem na mokro a nechat zaschnout.
		PERFORM	aktivní kyslík	1 % 1 sáček-40g do 4 l vody	2 hodiny	ABCTMV MRSA	
	RYCHLÁ DEZINFEKCE MALÝCH PLOCH	INCIDIN OxyFoam S	aktivní kyslík	konc.	3 min	ABCTMV MRSA	Povrch postříkat, rozetřít a nechat zaschnout.
		MIKROZID PAA wipes	kyselina peroxyoctová	konc.	5 min	A(B)C(V) MRSA	Povrchotřít ubrouskem a nechat zaschnout.
VELKÉ PLOCHY	VELKÉ PLOCHY	PERFORM	aktivní kyslík	1 % 1 sáček-40g do 4 l vody	2 hodiny	ABCMV MRSA	Vytřít či omýt pracovním roztokem na mokro a nechat zaschnout.
		PROCURA PE	peroxosloučenina	0,3%	30 min	ABCTMV MRSA	
		MEDICARINE tablety	chlor	1 tbl/1 l	30 min	ABCTV MRSA	
OSTATNÍ	VÝLEVKY, UMYVADLA, TOALETY, PISOARY	Čistič WC	chlor	konc.	30 min	A	Aplikovat na povrch a mechanicky očistit. Nechat působit co nejdéle.
		SAVO PRIM	chlor	3%	60 min	ABCMTV MRSA	Vytřít či omýt prac. roztokem na mokro a nechat zaschnout.
		ProCura Klorsept tablety	troklosen natrium	1/4 tbl / 1 l	30 min	ABCMTV, MRSA	Omýt připraveným roztokem, prolít sifon a nechat působit co nejdéle. Štětky zalít, roztok měnit každý den.

Roztoky dezinfekčních přípravků na povrchy se připravují na každou pracovní směnu ČERSTVÉ.

LEGENDA ÚČINNOSTI		
	A- baktericidní B - plně virucidní - i na neobalené viry (B) - omezeně virucidní T - tuberkulocidní	M - mykobaktericidní C - sporicidní V - fungicidní (V) - omezeně fungicidní

Vypracovala: Věra Deylová - nozokomiální sestra | **Schválila: PhDr. Lada Nováková, PhD. - náměstkyně pro ošetřovatelskou péči**

Za kontrolu a dodržování zodpovídají: staniční a vrchní sestry oddělení

Platnost od: 1. 4. 2019