



zahradní a krajinná tvorba

STAVBA :	TRANSFORMACE II – MANAGEMENT SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – SADOVÉ ÚPRAVY	DATUM:	ČERVENEC 2020
PROJEKTOVÁ ČÁST:	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	ČÍSLO PROJEKT. ČÁSTI:	1
ZADAVATEL:	KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOV 1882/57, 587 33 JIHLAVA	POČET PROJEKT. ČÁSTÍ:	7
LOKALITA :	MANAGEMENT SVĚTLÁ n/S, NOVÉ MĚSTO 71, 582 91 SVĚTLÁ N/S		
VYPRACOVAL	Ing. Markéta Majorová, DiS., Ke Křížům 1298, 584 01 Ledeč nad Sázavou		-

OBSAH

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	2
2.1	<i>Identifikační údaje stavby</i>	2
2.2	<i>Identifikační údaje investora</i>	2
2.3	<i>Identifikační údaje projektanta</i>	2
2.4	<i>Podklady pro zpracování</i>	2
2.5	<i>Přehled použité literatury</i>	2
2.	POŽADAVKY ZADAVATELE	3
3.	FOTODOKUMENTACE	3
4.	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ	5
4.1	<i>Normy</i>	5
4.2	<i>Návrh řešení</i>	5
4.2.1	<i>Grafická část – jednotlivé výkresy</i>	5
4.2.2	<i>Kompoziční řešení</i>	6
4.2.3	<i>Realizační práce</i>	6
a)	<i>Stavební práce - vybudování plochy kolem ohniště, instalace dřevěných konstrukcí (opora pro maliny bude nainstalována až po vytvoření kořenové bariéry), postřík plochy herbicidem</i>	7
b)	<i>Jemná modelace, vytýčení a vytvarování okrasných záhonů, postřík Herbicidem</i>	7
c)	<i>Navržené sadové úpravy – výsadby, a založení a výsev trávníku</i>	8
5.	PLÁN PÉČE	11
6.	OCHRANA, VÝSADBA A ÚDRŽBA DŘEVIN (všeobecná doporučení)	14
6.1	<i>Technologie výsadby, výsadba</i>	14
6.2	<i>Ošetření rostlin po výsadbě</i>	18
6.3	<i>Dokončovací a rozvojová péče</i>	18

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : **Transformace II – Management Světlá nad Sázavou (sadové úpravy)**
Místo stavby: Nové Město 71, 582 91 Světlá nad Sázavou
Okres : Havlíčkův Brod

1.2 Identifikační údaje investora

Zadavatel : **Kraj Vysočina**
Sídlo zadavatele: Žižkov 1882/57, 587 33 Jihlava

1.3 Identifikační údaje projektanta

Jméno: **Ing. Markéta Majorová , DiS.**
Adresa: Ke Křížům 1298
584 01 Ledec nad Sázavou
Tel.: 602 232 316
E-mail: majori@tiscali.cz
IČO: 76125629

1.4 Podklady pro zpracování

Katastrální mapa 1 : 1000
Podklady poskytnuté zadavatelem
Terénní průzkum současného stavu na místě samém 4 -8/2020

1.5 Přehled použité literatury

Hurych,V. (2003) : Okrasné dřeviny pro zahrady a parky, Květ, Plzeň
Koblížek, J. (2006) : Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků, Sursum, Tišnov

2. POŽADAVKY ZADAVATELE

Požadavkem zadavatele je navržení funkčního a reprezentativního zahradního prostoru s částečným využitím zahrady pro krátkodobou relaxaci a odpočinek.

Zahradní úpravy budou navrženy tak, aby bylo zabezpečeno soukromí a klidné prostředí v zahradě.

Zadáním je vypracování projektu.

3. FOTODOKUMENTACE



Prostor vyhrazený pro zeleň mezi jednotlivými budovami Managementu je úzký a naproti vchodu do hlavní budovy z velké části dne zastíněný.

Tento prostor bude reprezentativně koncipovaný.



V severní části pozemku bude prostor pro pasivní i aktivní relaxaci obyvatel. Plocha bude z velké části zatrvaněna. Vzniklé svahy budou osázeny, nebo na nich vznikne terapeutická skalka.



V době tvorby projektu na pozemku probíhaly intenzivní stavební práce, nebyly vybudovány plánované cesty a terén nebyl vymodelován. Z těchto důvodů mohou vzniknout mírné odlišnosti skutečnosti od projektu.

4. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

4.1 NORMY

Veškeré práce budou probíhat dle norem ČSN / DIN :

ČSN DIN 18 915 (83 9011) Práce s půdou

ČSN DIN 18 917 (83 9031) Zakládání trávníků

ČSN DIN 18 916 (83 9021) Výsadby rostlin

ČSN DIN 18 919 (83 9051) Rozvojová a udržovací péče o rostliny

ČSN DIN 18 920 (83 9061) Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních činnostech.

4.2 NÁVRH ŘEŠENÍ

4.2.1 Grafická část – jednotlivé výkresy:

- V grafické části **5. SOUČASNÝ STAV** je zachycena plánovaná modelace terénu s předpokládanými svahy. Na pozemku nezůstane žádná původní vegetace.
- Kompoziční řešení sadových úprav a rozložení rostlin, jejich druhy a počty jsou zaneseny v projektové části č. **6. OSAZOVACÍ PLÁN**. Rostliny jsou očíslovány a zapsány do seznamu rostlin.
- Osazovací plán trvalkových záhonů je řešen v projektové dokumentaci číslo **7. TRVALKOVÝ ZÁHON**.
- Grafická část **8. KÓTY** řeší velikost a umístění navržených záhonů a rozmístění kosterních či významných dřevin.

4.2.2 Kompoziční řešení

Návrh sadových úprav byl vypracován před dokončením stavby a před vytvořením hrubé terénní modelace pozemku. Je proto nutné počítat s mírnými odchylkami ve tvarech záhonů především tam, kde budou vymodelovány svahy.

Zahradní kompozice je založena na táhlých volných křivkách, které zabezpečí příjemné vnímání prostoru.

Jednotlivé křivky na sebe navazují a vytváří tak kompozičně jednotný prostor.

Prostory u vchodu na pozemek a přímo do hlavní budovy jsou pojaty především jako okrasné reprezentativní záhony. Zadní - severní část pozemku bude sloužit k pasivnímu i aktivnímu odpočinku. Důležitým prvkem pro aktivity v zahradě je terapeutická skalka navržená do terénní nerovnosti. Celá zadní partie zahradního prostoru Managementu bude pro pocitové zajištění klidu částečně oddělena od vydlážděné parkovací plochy stříhaným živým plotem .

Výsadby budou provedeny podle grafické části 6. Osazovací plán a 7. Trvalkový záhon. Před vchod do hlavní budovy jsou voleny rostliny, které částečně snášejí stín.

Do návrhu byly voleny především okrasné dřeviny. Kompozici doplňuje vysoká dřevina s lavičkou. V budoucnu bude fungovat, kromě jiného, jako mikroklimatický prvek v zahradě a přilehlých prostorách.

4.2.3 Realizační práce

- je doporučeno provádět postupně dle harmonogramu, aby bylo dosaženo maximálního účinku zamýšlených opatření.

Posloupnost prací :

- d) **Stavební práce – uložení kamenů do skalky a vytvoření na sucho položených šlapáků, postřik plochy herbicidem**
- e) **Jemná modelace, vytýčení a vytvarování okrasných záhonů, postřik herbicidem**
- f) **Navržené sadové úpravy – výsadby a založení a výsev trávníku**

Add. a) Stavební práce - vybudování plochy kolem ohniště, instalace dřevěných konstrukcí (opora pro maliny bude nainstalována až po vytvoření kořenové bariéry), postřik plochy herbicidem

Stavební práce je nutné provést **před sadovými úpravami**. Pozdějším provedením úprav by mohlo dojít k poškození rostlin, záhonů a trávníku a **sadové úpravy by mohly působit bez stavebních prvků nesmyslně** (např. rostliny ve skalce).

SKALKA A SCHODY Z KAMENNÝCH ŠLAPÁKŮ

Před započetím stavby skalky je nutné plochu důkladně odplevelit totálním herbicidem (alespoň 2x).

Kámen pro skalku bude použit ze zásob kamene, která bude na pozemku uskladněna.

Většinově by mohutnější kameny měly být umístěny ve spodních partiích svahu a menší v nejvyšší části skalky. Jednotlivé kameny by měly být asi z jedné třetiny zapuštěny do terénu a měly by být **položené na šířku**. Je nutné mezi kameny vynechat vhodná místa pro rostliny.

Jednotlivé spáry a volné plochy mezi kameny je doporučeno vysypat drtí ze stejné horniny. **Kamenné drtě působí jako mulč proti nadměrnému výskytu plevelů, zadržují vláhu a zlepšují celkový estetický dojem.**

Čím větší budou použity kameny, tím snadněji bude dosaženo dojmu rostlého skalního útvaru.

Kamenné šlapáky, které budou dle výkresu 6. Osazovací plán a 8. Kóty sloužit jako schůdky – budou položeny „na sucho“ ve štěrkovém loži tloušťky cca 3 cm. Kamenné šlapáky budou řádně upevněny v terénu proti sesuvu či jinému pohybu.

Do skalky bude použito 20 -25 kamenů (průměr 30 – 50 cm) jednoho druhu horniny – nesmí se jednat pouze o malé kameny.

LAVIČKA KOLEM STROMU – viz. níže

Add. b) Jemná modelace, vytýčení a vytvarování a založení okrasných záhonů, postřik záhonové plochy totálním herbicidem.

Vytýčení a vytvarování okrasných záhonů bude provedeno dle PD 8. Kóty.

Záhony:

- nejprve bude plocha pro výsadby a výsev trávníku odplevelena systémovým herbicidem
- **záhony budou vytýčeny a vyznačeny** (např. vápnem nebo pískem) dle výkresu č. 8. Kóty
- **Před započetím výsadeb** je nutné plochu navrženou pro výsadby stromů a keřů a výsev trávníku znova ošetřit totálním herbicidem dle návodu. Odstup od jednotlivých postřiků bude nejméně 3 týdny až měsíc.
- Po odstranění odumřelých rostlin budou záhony zkypřeny či zrotavátorovány.

- Rostliny budou vysazeny dle 6. Osazovacího plánu a 7. Trvalkový záhon do jamek s 50ti procentní výměnou půdy
- Okrasný listnatý strom bude ukotven třemi kůly. Kůra stromu bude natřena vápnem proti korní spále.
- Záhony s okrasnými keři a stromy budou po výsadbě zmulčovány borkou o tloušťce vrstvy 15 -20 cm. Vyšší vrstvu mulče je nutné dodržet - do záhonů není doporučena mulčovací netkaná textilie (s vyjímkou záhonů s růžemi, které se problematicky plejí.). Vyšší vrstva borky omezí výskyt plevelů a zamezí výpar.
- Trvalkové záhony je doporučeno zamulčovat štěrkem či kačírkem frakce 8/16 mm o tloušťce vrstvy 5 cm.

Add. c) Nově navržené sadové úpravy – výsadby a založení a výsev trávníku

Posloupnost prací:

1. *vytýčení a výsadba stromů, výsadba keřů a keřových skupin, výsadba trvalek*
2. *natažení netkané textilie v místech potřeby (růže)*
3. *zamulčování borkou a štěrkem*
4. *založení trávníku*

Při snížení počtu navržených rostlin je pravděpodobné, že sadová úprava nebude fungovat tak, jak je zamýšleno – rostliny nevytvoří zapojený porost či se zapojí o hodně později, a tím nedojde k včasnému omezení zapevlení záhonů – celkově se zvýší péče o sadové úpravy v průběhu následujících let.

VÝSADBOVÉ SPONY mezi jednotlivými rostlinami – u menších keřů (např. Spiraea japonica – tavolník japonský, Spiraea x bumalda – tavolník nízký, půdopokryvné růže, Potentilla fruticosa – mochna křovitá, Lavandula angustifolia – levandule úzkolistá..) je to od 40ti do 60ti cm – podle vzhledu rostliny. Správné výsadbové spony zabezpečí včasné zapojení keřových záhonů a tím omezení zarůstání plevelnými rostlinami, což by při správné technologii výsadeb mohlo nastat během 3-5ti let. Keře a trvalky ve skupinách se sázejí do trojspony.

Keře a stromy je doporučeno vysazovat do vylepšené půdy. Spodní vrstvu nové půdy ve výsadbové jámě je nutné promíchat s půdou stávající.

Okraje dostatečně velké výsadbové jámy pro výsadbu stromu je nutné zvrásnit (jáma nesmí být „hladká“)

Růst stromů a keřů je doporučeno podpořit tabletovým hnojivem Silvamix (2 tablet keř, 3 tablet strom)

Nově vysazený strom a keř budou zamulčovány drcenou borkou ve vrstvě 15 -20 cm. Vzhledem k tomu, že do záhonů není většinou doporučeno použití mulčovací netkané folie, musí být vrstva štěpky či borky vyšší (před výsadbou je nutné dbát na dobré odplevelení záhonu – totální herbicid).

Použití borky je zahradnický technologický postup, který zabezpečí rostlinám v prvních 2 - 3 letech po výsadbě vhodné podmínky pro zakořenění, udržení dostatečné vlhkosti v půdě, zastínění kořenové zóny rostlin a omezení výskytu plevelních rostlin. Po této době by již měly rostliny vytvořit dostatečně zapojený porost a tím by výše uvedené nedostatky měly být omezeny. **Borku po zapojení porostu není potřeba doplňovat.**

Navržená *Tilia cordata* bude ukotvena třemi kůly a bude doplněna kruhovou lavičkou dle výběru uživatele (předběžně byla vybrána **lavička Belfast** (fa. Forplast, <https://www.forplast.cz/lavicka-belfast>).



TRVALKOVÉ ZÁHONY A MÍSTA S TRVALKAMI

Pro oživení kompozice jsou na výrazná místa navrženy trvalkové záhony. Jejich umístění je vyznačeno ve výkresu 6. Osazovací plán

Některým druhům se v záhoně povede lépe a budou se rozrůstat bujněji – ty bude potřeba v budoucnu dělit a rozsazovat, naopak některé postupem času zcela vymizí. Trvalkový záhon je proto dobré doplňovat o rostliny, kterým se na lokalitě bude dařit.

Pro jarní efekt kvetení zahrady je důležité nezapomenout doplnit do trvalkového záhonu tulipány, narcisy, modřence – cibuloviny jsou navrženy pro tento záhon vysázeny ve směsi.

Důležité je dbát na výběr jednotlivých druhů jak tulipánů, tak narcisů – existují ranněji kvetoucí odrůdy a odrůdy později kvetoucí. Je proto doporučeno nakoupit narcisy i tulipány v různých sortách – vytvořit si směs odrůd, aby kvetení bylo dlouhodobější..

Cibuloviny budou vysazeny dle osazovacích plánů.

Rostliny, kterým dřevnatí část stonku (levandule, mateřídoušky..) je nutný každoroční řez namrzlých částí, který se provádí během března nebo dubna.

Zamulčování trvalkových záhonů je doporučeno štěrkem – **frakce 8/16 mm** ve vrstvě 5 – 8 cm. Štěrková vrstva chrání krčky rostlin před přemokřením, pozitivně působí na vodní režim rostlin a do určité míry brání výskytu plevelů a také jeho snazšímu vypletí. **Zamulčování borkou či štěpkou trvalkám nesvědčí.**

Pro mulčování trvalkových záhonů není v žádném případě doporučena netkaná textilie = mulčovací folie! – trvalky se nemohou dobře rozrůstat.. Folie je doporučena pouze v záhoně půdopokryvných růží.

Mulčovací folie je doporučena v místech, kde je plení velmi obtížné (např. půdopokryvné růže) - v záhonech folie často dělá neplechu – po čase „vylézá“ – což je nevhledné, její rozpad trvá dlouhá léta a pod jejím povrchem se často drží plísň. Omezí ale růst plevelů na dobu, než dojde k zapojení vysazených porostů keřů.

Při instalaci folie je doporučeno nejdříve vysadit rostliny a potom pokládat folii (v místech rostlin bude folie prostřížena a rostliny budou protaženy skrz otvor). Pokud by byl postup obrácen a rostliny by byly vysazovány do otvorů v již položené folii, bude docházet k znečištění folie zeminou a tím i k následnému většímu zaplevelování.

PŘEHLED KVETENÍ JEDNOTLIVÝCH ROSTLIN V TRVALKOVÉM ZÁHONĚ:

Číslo	Název	Výška	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	Buxus sempervirens - koule													
2	Buxus sempervirens - koule													
3	Rosa 'Knirps'								✿	✿	✿	✿		
4	Leucanthemum maximum	60-70 cm							✿	✿	✿			
5	Muscari	20 cm			✿	✿								
6	Narcissus	40-50 cm		✿	✿									
7	Nepeta x faassenii	35-45 cm				✿	✿	✿	✿	✿	✿			
8	Pennisetum alopecuroides	50-70 cm							✿	✿	✿			

TRÁVNÍK

Agrotechnický termín pro výsev trávníku je od počátku jara, cca do konce května a nebo od září do poloviny října – záleží na momentálním počasí

Pro výsev je doporučena travní směs do sucha.

- Např. **Travní směs do sucha (Hortus)** - 15 % jílek vytrvalý, dvě odrůdy, 5 % lipnice luční, 30 % kostřava rákosovitá, 20 % kostřava drsnolistá, 30 % kostřava červená, dvě odrůdy
- **Travní směs do sucha - Aros' (Oseva)** - Lolium perenne Esquire 20 % - jílek, Festuca arundinacea Scarlett 70 % - kostřava, Poa pratensis Sobra 10 % - lipnice)

Pozor na některé druhy travního osiva do sucha, kde je do směsi přidán jetel. Raději při nákupu dobře kontrolujte složení!! Volte raději směsi, které mají více odrůd od jednoho druhu trávy pro jistější zahuštění trávníku.

Trávníky s větším obsahem kostřavy trochu pomaleji vzcházejí, proto je po založení nutné o něco více trpělivosti - některé komponenty travní směsi (právě kostřavy) vzcházejí až po 3 – 4 týdnech .

5. PLÁN PÉČE

a) Všeobecně

- a.1. Udržovací péče a ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch bude prováděna v souladu s ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.
- a.2. Další možné práce se budou řídit oborovými normami:
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

b) Všeobecné pokyny pro údržbu vegetačních prvků

- b.1. Rozsah a termíny prací se řídí zejména stanovištními podmínkami vývojovým stadium a ekologickými hledisky. Nežádoucí rostliny je nutno odstraňovat, zpravidla mechanicky. Použití chemických přípravků je nutno omezit.
- b.2. Při zjištění závady je nutno neprodleně zajistit odstranění, aby nedošlo k větším škodám
- b.3. Větší opravy a zásahy musí provádět odborná firma s vědomím objednatele

Pro zdárný růst rostlin je důležitá následná péče, alespoň 3 roky po založení, s důrazem na pravidelnou dostatečnou zálivku.

Pravidelná zálivka stromů je prováděna s ohledem na konkrétní roční období a množství srážek. Zálivka musí být vydatná v delších časových intervalech. Nesmí docházet k trvalejšímu zamokření dřevin ani k dlouhodobějšímu proschnutí výsadbové jámy.

Četnost zálivky je nutno přizpůsobit aktuálním klimatickým podmínkám!!!

Po dvou letech po výsadbě je možné zálivku omezit na minimum.

Je třeba zajistit pravidelné přihnojování (způsob a četnost hnojení aplikovat dle potřeb jednotlivých druhů rostlin) a odplevelování výsadeb.

c) Vegetační prvky – stromy

c.1 následná péče 1. – 3. rok po výsadbě - stromy

- zalití 50-100l/ks - 6x/rok
- kontrola a oprava kotvení - 1x/rok
- odstranění kotvení - 1x (ve 3. roce po výsadbě)
- výchovný řez - 1x/rok
- ochrana proti chorobám - 1x/rok,
- odplevelení stromových mís - 2x/rok
- doplnění mulče - 1x (ve 3. roce po výsadbě)

c.2 následná péče 4. – 10. rok po výsadbě - stromy

- zajištění pravidelného odplevelování výsadbových mís
- v prvních letech až do věkového stádia dospívání stromů zajištění odborného výchovného řezu (viz. oborové standardy). Interval jednotlivých zásahů výchovného řezu je maximálně 2-3 roky.
- zajištění pravidelného odstraňování obrostu na kmeni stromu
- zajištění dostatečné ochrany při sečení travnatých ploch, aby nedošlo k poranění kmenů a kořenových náběhů žací mechanizací
- zajištění dostatečné zálivky v případě potřeby:
 - v jarních měsících (duben, květen) je zálivka ke stromům 50l na strom v četnosti 2-4x za měsíc,
 - v letních měsících (červen, červenec, srpen) 50 l na strom 4-8x za měsíc,
 - v podzimních měsících (září, říjen, popř. listopad) je 50 l na strom 2-4x za měsíc.
- Zajištění výměny suchých či nemocných jedinců

Četnost zálivky je nutno přizpůsobit aktuálním klimatickým podmínkám!!!

d) **Vegetační prvky – keře**

d.1 následná péče 1. – 3. rok po výsadbě - keře, skupiny keřů

- zalití 10l/ks - 6x/rok
- řez keřů - 1x/rok (pouze ve 3. roce po výsadbě)
- hnojení výsadeb - 1x/rok, naširoko
- ochrana proti chorobám - 1x/rok, včetně MAT
- odplevelení souvislých keřových skupin 3x/rok
- doplnění mulče - 1x (pouze ve 3. roce po výsadbě)

d.2 následná péče 4. – 10. rok po výsadbě - keře, skupiny keřů

- zajištění pravidelného odplevelování zapojených porostů a výsadbových mís solitérních keřů 2 – 3 x během vegetačního období
- zajištění a udržování odpíchnutí okrajů záhonů od travnaté plochy proti prorůstání trávou 2 – 3 x během vegetačního období
- odborné řezy (viz. oborové standardy) zajistit v intervalu jednotlivých zásahů maximálně 3 - 5 let.
- zajištění pravidelného odstraňování suchých částí rostlin, případně rostlin celých a jejich následné nahrazení, kontrola 2 x během vegetačního období

Četnost zálivky je nutno přizpůsobit aktuálním klimatickým podmínkám!!!

e) **Vegetační prvky – trvalky**

e.1 následná péče 1. – 3. rok po výsadbě – trvalky

- zalití 2l/ks – dle aktuálního počasí
- řez trvalek – 1 -2x/rok podle druhu (např. Nepetta pro opakované kvetení a pak odstranění odumřelých částí)
- hnojení výsadeb - 1x/rok, naširoko
- ochrana proti chorobám - 1x/rok
- odplevelení souvislých trvalkových skupin 3 - 5x/rok
- doplnění štěrku - 1x (pouze ve 3. roce po výsadbě)

d.2 následná péče 4. – 10. rok po výsadbě - trvalky

- zajištění pravidelného odplevelování porostů 2 – 3 x během vegetačního období
- zajištění a udržování odpíchnutí okrajů záhonů od travnaté plochy proti prorůstání trávou 2 – 3 x během vegetačního období
- zajištění dělení a rozesazování (případně odstranění) trsů
- zajištění pravidelného odstraňování suchých částí rostlin, případně rostlin celých a jejich následné nahrazení, kontrola 2 x během vegetačního období

Četnost zálivky je nutno přizpůsobit aktuálním klimatickým podmínkám!!!

6. OCHRANA, VÝSADBA A ÚDRŽBA DŘEVIN (všeobecná doporučení)

6.1 Technologie výsadby, výsadba

Sadové úpravy budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace.

6.1.1 Přípravná fáze před sázením

- *Hloubení jam*

Jámy mají být alespoň tak velké, aby se kořeny mohly volně rozložit a tak hluboké, aby byla pod nimi ještě prokypřená zem. Pro sadbu v kontejnerech a s kořenovým balem je nutné jámu vyhloubit vždy větší než je kontejner či kořenový bal. V nepříznivých podmírkách je nutno vykopanou zeminu z části vyměnit a nahradit ji kvalitnější zeminou obohacenou kompostem. Pro jehličnaný a stálezelený rostliny se obahacuje přidávaný substrát rašelinou. Stěny výsadbových jam je doporučeno zvrásnit pro lepší zakořeňování dřevin.

- *Prostokořenný materiál*

Výsadba prostokořenného rostlinného materiálu /listnaté stromy a keře/ spadá do období konce března až dubna. Podzimní termín výsadby závisí na opadu listů jednotlivých rostlinných druhů a průběhu počasí v daném roce. Zásadou je, že prostokořenný rostlinný materiál, který vysazujeme, nemá vyrašené listy. U prostokořenných rostlin před výsadbou redukujeme kořenový systém řezem /odstranění poškozených, uhynulých a nemocných částí/. Pro kvalitní růst a vývoj prostokořenných dřevin je nutné provedení zpětného řezu u listnatých keřů a zkrácení výhonů koruny u listnatých stromů. Po výsadbě je nutné provádět po dobu min. dvou až tří měsíců pravidelnou zálivku.

- *Dřeviny se zemním balem a dřeviny v kontejnerech*

U stromů dodávaných s kořenovým balem není třeba bal nijak upravovat, ani odstraňovat před výsadbou drátěné pletivo /tj. černý drát / a jutu. Oba tyto materiály se do pár let rozpadnou a nedochází k deformacím kořenového systému. Pozinkovaný drát je doporučeno odstranit. Sadbu v kontejnerech či s kořenovým balem můžeme běžně vysazovat i v době vegetace. Odpadá tak sezónnost jednotlivých prací.

Je důležité dbát na opatrnou manipulaci s živým materiélem tak, aby nedocházelo k větším poškozením

- *Úprava koruny*

Koruny rostlinného školkařského materiálu budou prosvětleny tak, aby se vyrovnal porušený poměr mezi kořenovou hmotou a hmotou koruny, vzniklý vyzvednutím dřeviny z původního stanoviště. Budou odstraněny poškozené, nebo jinak narušené výhony. Nesmí být odstraněn terminální vrchol.

6.1.2 *Výsadbový materiál*

Vysazovaný rostlinný materiál musí být svou kvalitou ve shodě s předepsanou normou. Použije se zdravý materiál z ověřených školkařských zdrojů.

Celý záhon se po výsadbě zamulčuje vrstvou borky /drcené kůry jehličnatých stromů/ ve vrstvě 10 – 15 cm. Výsadby budou do 3 – 5 dnů po zamulčování chemicky ošetřeny proti vzcházení plevelů ze semene / $\frac{1}{2}$ kg na 100m² /. Pokud bude použita netkaná textilie vrstva mulčovací kůry může být kol 5 – 10 cm.

6.1.3 *Zásady výsadby*

POKUD BUDE ZVOLENA VÝSADBA S POUŽITÍM NETKANÉ TEXTILIE - NEJDŘÍVE SÁZÍME ROSTLINY, FOLII POKLÁDÁME AŽ PO VYSAZENÍ ROSTLIN – folii rozprostřeme přes rostliny a pro každou rostlinu uděláme podle jejího umístění nástřih do kříže. Při opačném postupu (při vysazování rostlin po pokladce folie) by došlo ke znečištění folie zeminou a k následnému rychlému zaplevelení záhonů.

- *Výsadba stromů*

Pro zdárné založení vegetačních prvků je potřeba dodržet obvyklé biotechnické termíny přípravy stanoviště a výsadby. Nevysazovat v deštivém období, do zamokřené půdy – aby bylo možno kořenový bal patřičně obsypat, a aby nedošlo k nadměrnému zhutnění a zabránění přístupu půdního provzdušnění.

Pro výsadbu dřevin budou použity vzrostlé dřeviny, tak aby došlo k jejich co nedřívější funkčnosti a aby lépe odolaly v první fázi růstu případnému poškození. Dřeviny musejí být vzhledem k exponovanosti první třídy kvality, s bezchybnou, dobře zapěstovanou korunkou typickou pro daný druh. Dřeviny musejí mít kvalitní, dostatečně velký kořenový systém bez výrazného negativního poškození. Bude použito výsadbového materiálu se zemním balem. Dřeviny musejí odpovídat požadavkům normy ČSN DIN 18 196 Sadovnictví a krajinařství – Výsadby rostlin.

Vzrostlé stromy se vysází dle výkresu v projektové dokumentaci a dle vzoru se upevní /listnaté stromy 3mi kůly a jehličnaté stromy 1 kůlem/. Pro stromy se vyhloubí dostatečně velké jámy, které se vyhnojí / tabletovým hnojivem 4 - 6 ks na 1 strom – PREFORM nebo SILVAMIX či aplikací obalovaného hnojiva OSMOCOTE PLUS do půdního substrátu /.

Jamky pro výsadbu budou vyhloubeny min. 1,5 násobek šířky kořenového systému nebo balu. Výsadba bude provedena s výměnou zeminy 50%.

V případě, že hloubka jámy je větší než výška balu, je třeba nejprve vyplnit dno jámy do potřebné výšky substrátem. Stromy sázíme tak, aby kořenový krček byl v úrovni terénu, to je stejně hluboko, jako byly vysázeny ve školce. Po uložení balu do středu výsadbové jámy se do dna jámy zatlučou kůly statického zajištění ve zvoleném počtu a rozmístění a bal se zasype substrátem,

který se pečlivě hutní – ve vrstvách po cca 10ti cm. Po z hutnění substrátu se výsadba prolije dostatečným množstvím vody, v případě sesednutí povrchu se doplní substrát a povrch jámy – tzv. kořenová mísa se upraví a navrství vrstvou drcené kůry.

Stromy budou ukotveny stabilním, dřevěným minimálně trojbodovým systémem. Budou použity dřevěné frézované kůly o průměru 5 -10 cm se špicí a fazetou (250 cm). Kůly budou mezi sebou spojeny v horní části dřevěnými latěmi pro zpevnění. Výška kotevního systému musí být vzhledem ke stromu dostatečné výšky tak, aby nemohlo dojít při náporu větru k jejímu ohnutí, ale také aby nedocházelo k poškození spodních větví zapěstované korunky. Stromy se upevní vyvazovacími popruhy z přírodního či syntetického materiálu tak, aby úvazek umožnil dřevinám sesedání spolu s půdním substrátem a nezpůsoboval boční výkyv stromu, nesmí však kmen zaškrtit či odřít. U jehličnatých stromů zatloukáme jeden kůl šikmo.

V rámci rozvojové péče je třeba ukotvení dřeviny pravidelně každoročně kontrolovat a případné vady odstranit. Po zakořenění stromů na stanovišti je třeba odstranit kůly i s vazbou, aby nedocházelo k jejímu zarůstání do sílicího kmínku.

- *Výsadba keřů*

Ve většině případů je sadba rostlinného materiálu dodávána v kontejnerech min. objemu 3 litry.

Půda pro výsadbu má být řádně zpracována do hloubky minimálně 35 cm – rytím.

Likvidace plevelů /zejména vytrvalých/ by měla být provedena před výsadbou a měla by být aplikována 2x v několikatýdenním odstupu. Likvidace vytrvalých plevelů je nejúčinnější chemickou cestou – postřík herbicidem – např. ROUNDAPem. Postřík provádět za teplého, slunného a bezvětrného počasí.

Výsadba rostlinného materiálu bude do jamek o objemu rovnajícímu se velikosti kontejneru /vzhledem k záhonové přípravě půdy nejsou větší jamky nezbytné/. Dodání minerálních hnojiv – pro zásobní hnojení může být aplikováno tabletové hnojení do výsadbových jamek – dvě tablety PREFORMU nebo SILVAMIXU ke každému keři, jedna tableta k trvalkám či.

Celý záhon se po výsadbě namulčuje vrstvou borky ve vrstvě 10 - 15 cm.

K jehličnanům a stálezeleným listnáčům přidáváme pro úpravu reakce půdy rašelinu.

- *Výsadba a ošetřování tvarovaných živých plotů*

Před výsadbou se zpracuje, popř. zlepší půda v pásu alespoň 50 cm širokém. Sází se podle šňůry do jamek nebo do vykopané rýhy. Vzdálenost se řídí velikostí sazenic a mohutností růstu. Po výsadbě se rostliny rovně sestříhnou /listnáče asi o polovinu, jehličnany se jen zarovnají/ a zalijí.

Z údržbových prací je nejdůležitější řez. První seříznutí opadavých dřevin musí být hluboké – podpora tvorby výhonů z kořenového krčku nebo z přízemní části rostliny – základ hustého větvení. Dřeviny je nutné seříznout na výšku 15 – 20 cm. Dále se tvarují jehličnany a stálezelené listnáče jednou ročně, a to nejlépe koncem léta až na podzim nebo zjara. Opadavé listnáče vyžadují řez dvakrát ročně, a to v době vegetačního klidu a koncem června až začátkem července. Boční stěny se tvarují mírně šikmo – konicky – tak aby širší část keřů byla u země.

- *Trávník*

Trávník bude založen výsevem osiva po předchozích úpravách jako je odplevelení, hrubá a jemná modelace terénu, doplnění substrátu, pohnovení plochy. Po těchto úpravách následuje výsev a zapravení travního semene, utužení půdy po osetí a závlaha.

Agrotechnický termín osevu se pohybuje od konce března či začátku dubna do poloviny září (mimo letního období).

Základní údržba, jako je odplevelení, hnojení, sečení, zavlažování, provzdušňování, čištění, vyhrabávání a válení udrží jeho vzhled a zlepší zdravotní stav a životnost.

V jarním období je třeba trávníky vyhrabat, aby se odstranila přebytečná a mrtvá stébla a listí a drny se provzdušnily. Usazují se v nich jinak mechy a plevele, které nepropustí vzduch a vlhkost ke kořenům.

Odplevelení – zaplevelení trávníků je možno předejít správnou agrotechnikou při založení i po něm. Jednoleté plevele ustoupí při včasném sekání trávníku. Vytrvalé širokolisté plevele se na malých plochách odplevelují ručně vypichováním. Možné je použití širokospektrálních herbicidních přípravků za předpokladu dodržení bezpečnostních pravidel.

Možnosti boje s nežádoucími plevelemi:

- přizpůsobit výšku sečení tak, aby nedošlo k tvorbě semen
- regulovat závlahu a nezpůsobovat dlouhodobé podmáčení travnatých ploch
- odstraňovat posečenou travní hmotu a spadané listí
- provzdušňováním půdního profilu – prořez, prořez s dosevem travních komponentů
- hnojení
- dosev
- použití herbicidních přípravků /např. LONTREL 300 apod./

Sekání – častým sekáním trávníku se zabrání travám vytvořit plodná stébla a naopak se podpoří odnožování a tvorba krátkých sterilních stébel – trávník je jemný, hustý .

Závlaha – nutná pro dobrý vývoj. Důležité je zavlažovat trávník po každé seči a aplikaci hnojiv. V letních měsících se trávníky zavlažují ráno i večer. Optimální formou závlahy je jemný postřík.

Hnojení – nedostatečným hnojením dochází k oslabení a řídnutí trávníku a na jejich místa nastupují trávníkové plevele, které nemají tak vysoké nároky na půdu, nebo koření hluboko.

Při časté seči trávníky vyžadují vyšší dávky dusíkatých hnojiv. Aplikace anorganických hnojiv ve vegetačním období je u intenzivně udržovaných travnatých ploch 6x – 8x / tj každý měsíc/. Pro hnojení trávníkových ploch můžeme použít plných hnojiv typu CERERIT, HYDROCOMPLEX, výhodné je použití dlouhopůsobících hnojiv.

Organická hnojiva používáme jedenkrát za 3 roky. Organickým hnojivem rozumíme rozložený a prosátný materiál – kompost, křemičitý písek s rašelinou, ornice s pískem a rašelinou. Organické hnojivo rovnoměrně rozprostřeme po ploše a zapravíme ocelovou sítí. Vhodnou dobou pro aplikaci organických hnojiv je jaro.

6.2 Ošetření rostlin po výsadbě

Zálivka těsně po výsadbě musí být důkladná. Později se zalévá se méně často, ale větším množstvím vody.

U opadavých dřevin je důležitý řez nadzemní části. Usnadní se tím ujmutí sazenice, neboť se značně zmenší odpar, upraví se tvar rostlin a podpoří se zesílení a rozvětvení. Odstraní se též přebytečné výhony – slabé, poškozené či rostoucí nesprávným směrem. V dalších letech provádíme řez zdravotní a v případě potřeby řez tvarovací. Jehličnany a stálezelené keře se po výsadbě většinou neřežou /stálezelené listnáče snášejí řez stejně dobře jako opadavé/.

Proti nežádoucímu zaplevelování porostu je dobré chránit rostliny mulčováním povrchu půdy, nejlépe jemně drcenou, částečně rozloženou kůrou v tloušťce vrstvy cca 10 - 15 cm. Vrstva drcené kůry má i funkci ochrannou při mrazivých dnech a prodlužuje vegetační období rostlin. K ochraně půdy proti zaplevelení lze úspěšně využít mulčovací plachetky, která se pokládá na půdní povrch pod mulčovací vrstvu.

6.3 Dokončovací a rozvojová péče

Při tzv. dokončovací péči v roce výsadby je nutné pravidelně zalévat vysazené jedince, nejlépe 8x množstvím 100 l/ks. Alespoň první rok je vhodné nechat kolem nově vysazeného stromu kořenovou mísu ze zeminy, která slouží k zachycení vody, jak při zalévání, tak při deštích. Mísu je vhodné zamulčovat z důvodů menšího vypařování a růstu plevelů. Kotvení se průběžně kontroluje, popřípadě se znova obnoví.

Rozvojová péče probíhá druhý až třetí rok po výsadbě a je obdobou dokončovací péče. Opravný řez stromů /napravení nevhodného větvení/ může být proveden u blíže neurčitého počtu jedinců, je závislé na kvalitě dodávaného výsadbbového materiálu. Dále se jedná o překontrolování úvazků, kotvení, mulčování apod. Samozřejmostí je průběžné odplevelování výsadeb. Po dostatečném zesílení a zakořenění stromů je nutné kotvíci prvky odstranit.