

NÁLEZOVÉ MAPY VÝZNAMNÝCH DRUHŮ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

1. Rostliny

rašeliník modřínový (*Sphagnum contortum*)

Místo nálezů: plocha 20



hladýš prudký (*Laserpitium prutenicum*)

Místo nálezů: plocha 16, 20, 32

Druh se může vyskytovat i jinde na lokalitě.

vachta trojlistá (*Menyanthes trifoliata*)


Místo nálezů: plocha 08, 08, 27

Druh se může vyskytovat i jinde na lokalitě.

vemeník zelenavý (*Platanthera chlorantha*)

Místo nálezů: plocha 19, 23

Druh se může vyskytovat i jinde na lokalitě.



všivec lesní (*Pedicularis sylvatica*)

Místo nálezu: plocha 32, 09

Druh se může vyskytovat i jinde na lokalitě.

tolíje bahenní (*Parnassia palustris*)

Místo nálezu: plocha 05, 13, 14, 15, 19, 20, 25, 34


Druh se může vyskytovat i jinde na lokalitě.



prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*)

Místo nálezu: plocha 09, 12/13, 14, 20


Druh se může vyskytovat i jinde na lokalitě.



ostřice Davallova (*Carex davalliana*)

Místo nálezu: plocha


Druh se může vyskytovat i jinde na lokalitě.



2. Živočichové

Svižník polní (*Cicindela campestris*)


Místo nálezu: plocha 17 – cesta na hrázi rybníka



střevlík Scheidlerův (*Carabus scheidleri*)

místo nálezu: plocha 01, 12, 16, 17, 20, 25 a v ochranném pásmu severně od obce Hlína.

Druh byl nalezen ve všech umístěných pastech. Z toho lze usuzovat, že se vyskytuje na celé ploše PR.




modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*)

místo nálezů: plocha 01 - okraje koryta Doubravy, kde byly zbytky nepokoseného krvavce lékařského (*Sanguisorba officinalis*)

Druh se pravděpodobně vyskytuje i mimo míst nálezů v PR.


Nejvhodnější plochy pro jeho vývoj jsou 5, 14, 25, 29, 37. Tyto plochy jsou navrženy k příslušné úpravě managementu.



hnědásek rozrazilový (*Melitaea diamina*)

místo nálezů: celá lokalita


Housenka se vyvíjí na kozlíku (*Valeriana* spp.), proto je nutné přednostně nekosit tyto plochy v době vývoje housenek a výskytu kladoucích samic. Nejvhodnější plochy pro jeho vývoj jsou 03, 04, 07, 12, 20 a 32.



čolek horský (*Ichthyosaura alpestris*)

místo nálezu: plocha 38 - tůň pod Hlínou v SV části PR

Druh se v tůni rozmnožuje. Mimo toto období se pravděpodobně vyskytuje i mimo místo nálezu v PR.




čolek obecný (*Lissotriton vulgaris*)

místo nálezu: plocha 17 - Zahájský rybník

plocha 38 - tůň pod Hlínou v SV části PR

Druh se pravděpodobně vyskytuje i mimo míst nálezu v PR.




ropucha obecná (*Bufo bufo*)

místo nálezu: plocha 17 - Zahájský rybník a okolí

plocha 25 - JV část lokality, u Hlíny

Druh se pravděpodobně vyskytuje i mimo míst nálezu v PR.



rosnička zelená (*Hyla arborea*)

místo nálezu: plocha 11

Druh se pravděpodobně vyskytuje i mimo míst nálezu v PR.

skokan krátkonohý (*Pelophylax lessonae*)

místo nálezu: plocha 17 - Zahájský rybník a okolí

plocha 38 - tůň pod Hlínou v SV části PR

plocha 01 - kaluže a mokřady v SZ části lokality

plocha 29, 33, 36 - mokřady

Druh se pravděpodobně vyskytuje i mimo míst nálezu v PR.

ještěrka živorodá (*Zootoca vivipara*)


místo nálezu: plocha 18 - mokřad pod Zahájským rybníkem

Druh se pravděpodobně vyskytuje i mimo míst nálezu v PR.

ještěrka obecná (*Lacerta agilis*)

místo nálezu: plocha 28

Druh se pravděpodobně vyskytuje i mimo míst nálezu v PR.



užovka obojková (*Natrix natrix*)


místo nálezu: plocha 38 - tůň pod Hlínou v SV části PR

Druh se pravděpodobně vyskytuje i mimo míst nálezu v PR.

zmije obecná (*Vipera berus*)

místo nálezu: plocha 33 - mokřad pod Zahájským rybníkem

Druh se pravděpodobně vyskytuje i mimo míst nálezu v PR.



chřástal polní (*Crex crex*)

místo nálezu: plocha 13, 14 a 19 – sušší mechanizačně kosené louky
Druh se pravděpodobně vyskytuje i mimo míst nálezu v PR.

bekasina otavní (*Gallinago gallinago*)

místo nálezu: plocha 16 a 18 - mokřad nad a pod Zahájským rybníkem
Druh se pravděpodobně vyskytuje i mimo míst nálezu v PR.

